



Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud



Licenciatura en Médico Cirujano y Partero

Comunicación y Tecnologías de la Información

Actividad 3A. Gestión de la información. Literacidad Académica

Alumnos:

Castellanos Olvera Miguel Angel 21651017

Comparán Romero José Alexis 216591017

Encarnación Avalos Mariana Elizabeth 216601861

Méndez Gómez Lesly Esmeralda 217103768

Maestro: Herrera Estrada Oscar Arturo

Fecha de entrega: 03 de abril de 2020

Correo electrónico:


[miguel.colvera@alumnos.udg.mx](mailto:miguel.colvera@alumnos.udg.mx)

[alexis.comparan@alumnos.udg.mx](mailto:alexis.comparan@alumnos.udg.mx)

[lesly.mendez@alumnos.udg.mx](mailto:lesly.mendez@alumnos.udg.mx)

[elizabeth.encarnacion@alumnos.udg.mx](mailto:elizabeth.encarnacion@alumnos.udg.mx)

## A) Elaboración de un mapa semántico.



## B) **Elaboración de un cuadro de evidencias**

Tesis: Los diferentes tratamientos para el síndrome de ovario poli quístico.

### Razón 1: **Tratamiento farmacológico**

- **Evidencia:** Eflornitina (agente tópico que inhibe la ornitín descarboxilasa), observando beneficios notables hasta después de 6 meses de su uso.
- **Evidencia:** En pacientes con SOP y resistencia la insulina se ha recomendado utilizar agentes sensibilizadores de insulina.

### Razón 2: **se pueden implementar estilos de vida y dietas.**

- **Evidencia:** El tratamiento en pacientes sin deseo de embarazo está basado en los cambios en el estilo de vida, anticonceptivos orales y agentes antiandrogénicos
- **Evidencia:** El tratamiento de pacientes con SOP está enfocado principalmente a lograr una disminución en morbilidad ya que un porcentaje importante de estas pacientes cursan con sobrepeso, obesidad y alteraciones metabólicas.

### Razón 3: **tratamiento quirúrgico para un posible avance más eficaz**

- **Evidencia:** el tratamiento quirúrgico ovárico es eficaz para inducir la ovulación.
- **Evidencia:** Los riesgos de la cirugía ovárica en el SOP es proceso adherencial postquirúrgico, el cual puede reducirse con lavado abdominal y/o liberación de proceso adherencia.

## **Bibliografías:**

- IMSS. (2010, 8 marzo). Abordaje Integral del Síndrome de Ovarios Poliquísticos. Recuperado 1 abril, 2020, de [http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/000GER\\_OvariosPoliquisticos.pdf](http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/000GER_OvariosPoliquisticos.pdf)
- Síndrome del ovario poliquístico: MedlinePlus enciclopedia médica. (2018, 14 enero). Recuperado 1 abril, 2020, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000369.htm>
- Mayo Clinic. (2017, 29 agosto). Síndrome de ovario poliquístico - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic. Recuperado 1 abril, 2020, de <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pcos/diagnosis-treatment/drc-20353443>